



TOUT SAVOIR SUR LA VACCINATION BCG

INDICATIONS, MODALITES ET EFFETS

POUR QUI ?

Elle n'est plus obligatoire pour tous mais **reste recommandée dès 1 mois et jusque 15 ans dans les situations ci-dessous** :

- antécédent familial de tuberculose
- enfant résidant à Mayotte, en Guyane et en Ile de France
- enfant né, ou devant séjourner dans un pays de forte endémie tuberculeuse (Afrique, Asie sauf Japon, de nombreux pays du Moyen et Proche Orient, d'Amérique centrale et du Sud, d'Europe centrale et d'Europe de l'Est)
- enfant dont au moins un des parents est originaire d'un de ces pays
- enfant devant séjourner au moins un mois d'affilée dans l'un de ces pays
- toute autre situation jugée à risque d'exposition par le médecin.

POURQUOI ?

Elle ne permet pas d'empêcher la transmission de la tuberculose mais permet d'éviter les formes graves de la tuberculose (méningites et septicémies) chez les enfants.

COMMENT ?

A partir de l'âge de six ans, une intradermoréaction est obligatoire avant la réalisation du vaccin. La vaccination se fait **par voie intradermique** dans le bras gauche

QUELLES RÉACTIONS APRÈS ?

Les réactions allergiques au vaccin sont rares et surviennent dans les minutes suivant la vaccination.

Dans les semaines qui suivent la vaccination, il existe une induration autour de la zone piquée, avec parfois une ulcération et/ou un écoulement et/ou un ganglion sous le bras.

Dans de rares cas, il est possible que l'ulcération devienne plus profonde, qu'un abcès (collection douloureuse de pus) se forme à l'endroit où le vaccin a été injecté, ou que le ganglion sous le bras qui a été vacciné s'infecte, devienne mou et s'accompagne de fièvre. Si cela se produit, consultez votre médecin.

La vaccination peut laisser une cicatrice plate.

POURQUOI S'INTERESSER A LA TUBERCULOSE ?

- **La tuberculose est une maladie bactérienne** qui atteint le plus souvent les poumons mais qui peut également atteindre d'autres organes.
- **Les enfants y sont plus vulnérables** et peuvent faire des formes graves (méningite tuberculeuse, tuberculose miliaire)
- Elle se transmet de personne à personne, **par la toux ou les postillons** lors de contacts rapprochés et répétés.
- Encore quasi **5000 personnes par an en France contractent la tuberculose**. La prévention (dépistage, vaccination) est essentielle pour continuer de réduire son incidence !

Centre de Lutte Anti Tuberculeuse (CLAT) de Tourcoing

Secrétariat : 03.20.69.49.02 | clat@ch-tourcoing.fr

🕒 Ouvert du lundi au vendredi | 8h30 à 16h30

