COREVIH
HAUTS-DE-FRANCE

Diagnostic et dépistage des infections sexuellement transmissibles (IST) : organisation régionale des CEGIDD

Dr Hélène BAZUS

Journée des référents en antibiothérapie
07/11/2024

Un CeGIDD, c'est quoi ?

Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de Diagnostic du VIH, des hépatites virales et des IST

Missions du CeGIDD :

- Dépistage du VIH, des hépatites virales et des IST
- Prise en charge des IST, symptomatiques ou non
- Vaccination contre les IST : VHA, VHB, HPV, variole...
- Délivrance de TPE (traitement post-exposition au VIH)
- Délivrance de PrEP (prophylaxie pré-exposition au VIH)
- Informations et accompagnement en santé sexuelle
- Délivrance de matériel de prévention : préservatifs internes et externes, gel, matériel de RDR
- Délivrance de la contraception d'urgence
- Orientation : psychologue, addicto, réseau communautaire, etc...

Traitement Post Exposition:

ou

Traitement d'urgence:
Le plus tôt possible après un risque et maximum 48h après pour éviter d'être contaminé,
En Maladies Infectieuses ou aux Urgences

Dépistage:
Pour connaître son statut sérologique, se soigner et protéger ses partenaires,
Prise de sang (anonyme ou non), Trod, Autotest

Préservatifs:
Masculin, Féminin, Interne ou Externe ...
Pour éviter le VIH et IST ...
A consommer pour TOUTES les pratiques

Prophylaxie Pré-Exposition:
Traitement pour les personnes qui n'ont pas le VIH, mais qui n'utilisent pas systématiquement le préservatif

Réduction Des Risques:
Matériel à usage unique pour le **sniff, seringue et petit matériel jetable** pour l'injection

RDR

TPE

DÉPISTAGE

PRÉSERVATIFS

PRÉP

TASP

**CONTRE LE VIH
UN ÉVENTAIL
DE POSSIBILITÉS**

Le TasP:
Traitement comme Prévention:
Permet à tous les patients séropositifs, traités et indétectables depuis 6 mois de ne plus transmettre le virus

Principes pour aborder la santé sexuelle

Préservatifs

Toujours d'actualité, efficace contre

- Le VIH
- La plupart des IST
- La grossesse non désirée

Depuis décembre 2018

- 2 marques de **préservatifs externes** agréées par le Ministère de la Santé remboursées sur prescription médicale ; ordonnance renouvelable pendant 1 an
- Eden ou Sortez Couverts
- Taille classique ou XL

Depuis janvier 2023

- **Gratuit** en pharmacie pour les moins de 26 ans

Depuis décembre 2023

- Préservatif **interne** OMBRELLE gratuit pour les moins de 26 ans
- Sur ordonnance à partir de 26 ans

Traitement Post-Exposition (TPE)

Principe du TPE

- **Instauration en URGENCE, au mieux dans les 4 h, et jusqu'à 48h après l'exposition**
- Aide à la décision : <https://sexpoz.vihack.fr/questionnaire/sexpoz>

Lieux de prise en charge initiale

- Service des urgences hospitalières : délivrance d'un kit d'urgence
- CeGIDD
- Service d'infectiologie

Réévaluation /suivi

- CeGIDD
- Service d'infectiologie

Modalités pratiques

- Trithérapie ARV pendant 28 jours
- Toujours associé à un **suivi préventif** : vaccinations, dépistage des IST / traitement systématique, notification au(x) partenaires, surveillance de la tolérance +/- orientation vers une PrEP

PrEP : Prophylaxie pré-exposition

A qui s'adresse la PrEP ?

- Toute personne séronégative pour le VIH mais exposée au VIH en raison de sa sexualité

Quelles molécules ?

- Bithérapie combinée ARV : Emtricitabine 200mg/Tenofovir disoproxil 245 mg

Qui peut prescrire ?

- Tout médecin depuis le 1^{er} juin 2021
- Formation en ligne gratuite et validante DPC proposée sur [FormaSantéSexuelle - Plateforme d'apprentissage en ligne](#)

PrEP : Prophylaxie pré-exposition

Quel schéma thérapeutique ? ?

- Prise continue
- Prise discontinue ou à la demande uniquement chez les hommes cisgenres (appli d'aides à l'observance)

Quel suivi ?

- Suivi trimestriel, mise à jour des vaccinations
- Observance/tolérance
- Dépistage systématique des IST / traitement / notification aux partenaires
- Dépistage des consommations de produits / accompagnement

❖ IST ou MST ?

- On préférera le terme IST, soit Infections Sexuellement Transmissibles, car elles ne sont pas forcément symptomatiques
- On peut être porteur sans symptôme et transmettre l'infection

❖ De quelles infections parle-t-on ?

- IST bactériennes : syphilis, chlamydioses, gonocoques, infections à *Mycoplasma genitalium*
- IST virales :
 - Très répandue : HPV, herpès
 - VIH et VHB
 - VHA et VHC, des IST aussi ?
- IST parasitaire : *Trichomonas vaginalis*

- Toutes les IST ne se dépistent pas

- ❖ Syphilis : la grande dissimulatrice
 - Chancre indolore : inaperçu s'il est profond ou anal
 - Phases de latence, précoce (<1 an) ou tardive
 - Risque d'évolution vers une forme grave (neurologique, vasculaire, osseuse) ou risque de découverte pendant la grossesse en l'absence de dépistage
- ❖ *Chlamydia trachomatis*
 - Asymptomatique dans 50% des cas chez l'homme et jusqu'à 90% chez la femme
 - Risque de complications : salpyngite, GEU, troubles de fertilité...
- ❖ *Neisseria gonorrhoeae* :
 - Asymptomatique dans 70 % des cas
- ❖ VIH, VHC, VHB : rarement symptomatiques en dehors des phases de primo-infection ou de complications

Contexte épidémiologique

Figure 2 / Evolution du nombre de diagnostics d'infection à gonocoque, France, 2004-2017

Source : Réseau RésIST, SpFrance

Figure 3 / Evolution du nombre de diagnostics d'infection à *Chlamydia*, France, 2000-2017

Source : Réseau Rénachla, SpFrance

Contexte épidémiologique

- ❖ Incidences des IST en hausse depuis les années 2000, et encore plus depuis 2012
- ❖ Démocratisation des rencontres de courtes durées via les applications
- ❖ Evolution de la sexualité, transmissions bucco-génitales fréquentes

Organisation des CeGIDD dans les Hauts de France

Département	Ville	Adresse	Téléphone	PrEP	TPE	Accompagnement communautaire
NORD (59)	LILLE	13 Rue Camille Guérin	08 05 04 00 22 numéro vert	oui	oui	En cours
	DUNKERQUE	Maison de quartier basse ville 49 rue de la Paix	03 21 46 35 46	oui	oui	non
	TOURCOING	CH DRON 155, rue du Président Coty	03 20 69 46 05	oui	oui	oui
	VALENCIENNES	57 avenue Faidherbe	03 59 73 25 40	oui	oui	non
PAS-DE- CALAIS (62)	ARRAS	CH Arras 3 Bd Georges Besnier	03 21 21 14 24	oui	non	non
	LENS	CH Lens 99 route de la Bassé	03 21 69 10 94	oui	oui	oui
	HENIN- BEAUMONT	CH Henin beaumont 585 avenue des Déportés	03 21 08 63 12	non	non	non
	BETHUNE	CH Béthune 27 rue Delbecque Beury	03 21 64 44 26	oui	oui	non
	CALAIS	CH Calais 1601 boulevard des Justes	03 21 46 35 46	oui	oui	non
	BOULOGNE SUR MER	Centre de santé sexuelle 178 rue Faidherbe	03 21 21 62 33	non	non	non

Organisation des CeGIDD dans les Hauts de France

Département	Ville	Adresse	Téléphone	PrEP	TPE	Accompagnement communautaire
AISNE	LAON	CH Laon Rue Devismes	03 23 24 33 16	oui	non	
	SAINT-QUENTIN	CH St Quentin 5 rue Arnaud Bisson	03 23 06 74 74	oui	non	
	SOISSONS	CH Soissons 46 avenue du Général de Gaulle	03 23 75 74 04	oui	non	
OISE	BEAUVAIS	Office privé d'hygiène sociale 91 rue Saint-Pierre	03 44 06 53 40	oui	oui	
	COMPIEGNE	CH Compiègne-Noyon 8 avenue Henri Adnot	03 44 23 63 12	oui	oui	
SOMME	AMIENS	Centre de prévention 16 bis rue Fernel	03 22 66 75 10	oui	oui	oui
	ABBEVILLE	Centre de prévention 52 rue du soleil levant	06 48 28 31 57	oui	oui

COREVIH
HAUTS-DE-FRANCE

Nouveaux dispositifs de dépistages : articulation avec l'organisation régionale

Journée des référents en antibiothérapie
07/11/2024

VIH test

SANS FRAIS. SANS ORDONNANCE. SANS RENDEZ-VOUS.

Organisation régionale

Rôle d'appui du COREVIH

► Accompagnement des biologistes

- à l'annonce d'une séropositivité
- à l'orientation des personnes vers le soin/vers l'offre de prévention
- au recueil des besoins de prise en charge des personnes VIH+

Mise en place d'un numéro vert régional réservé aux professionnels

03 10 01 01 35

Mise en service prévue début juillet

Rôle d'appui du COREVIH

► Accompagnement des biologistes

Annonce du résultat + par le biologiste et proposition du dispositif d'orientation VIH TEST

le patient accepte le dispositif

Le biologiste appelle le numéro vert
Avec le médecin VIH de permanence, est réalisé le recueil des besoins du patient, l'orientation et le choix d'un centre de prise en charge

Le médecin VIH de permanence organise un RDV dans les 48H ou 5 jours ouvrés maximum dans le centre de prise en charge choisi

Le médecin VIH de permanence rappelle le patient pour lui communiquer les informations relatives au rendez-vous

le patient refuse le dispositif

Renvoi vers le médecin traitant

Renvoi vers l'annuaire des centres de prise en charge si refus ou pas de médecin traitant

Je ne pensais pas
qu'on pouvait
le faire comme ça.

Quand on est sexuellement actif,
c'est bien de faire régulièrement un test.
Avec Mon test IST,
faites-vous dépister de certaines
infections sexuellement
transmissibles sur simple demande
directement en laboratoire.
Et c'est pris en charge à 100%
par l'Assurance Maladie
pour les moins de 26 ans.

Sans ordonnance. Sans rendez-vous. Sans frais pour les -26 ans.

- ❖ Organisation régionale en cours
- ❖ Travail avec les URPS :
 - ❖ Messages de prévention associés au rendu des résultats
 - ❖ Guides de prescription pour le traitement des SIT simples
 - ❖ Annuaires des CeGIDD et services de maladies infectieuses pour orientation des cas plus complexes
 - ❖ Webinaire de mise à jour des connaissances

- ❖ Diffusion de la formation gratuite et validante DCP en ligne : FORMA SantéSexuelle

The screenshot shows a web browser window with the URL 'https://www.formasantesexuelle.fr'. The browser's address bar and tabs are visible at the top. The website header features the 'FORMA SantéSexuelle' logo, which consists of a stylized infinity symbol and the text 'FORMA SantéSexuelle'. Below the logo, it says 'Plateforme d'apprentissage en ligne FormaSantéSexuelle'. The main content area has a dark blue background with the hashtag '#JeSuisProfessionneldeSanté' and the text 'JE ME FORME À LA SANTÉ SEXUELLE' in white, bold, uppercase letters.

	Traitement de référence	Alternative
Infections à <i>Chlamydia trachomatis</i>	Doxycycline 200 mg/j 7 jours	Azithromycine 1g en dose unique Non recommandé pour les ano-rectites
Infections à <i>Neisseria gonorrhoeae</i>	Ceftriaxone 1 g IM ou IVL Dose unique	Faire culture/ ATBgramme Azithromycine 2g
Infections à <i>Mycoplasma genitalium</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Sensible aux macrolides : Azithromycine : 500 mg J1 puis 250 mg/j de J2 à J5 - Résistant aux macrolides : Moxifloxacin 400 mg/, 7 j 	
Syphilis précoce (<1 an) Primaire, secondaire ou latente En l'absence de signes neuro-sensoriels	Benzathine Benzylpénicilline 2,4 millions d'UI IM Dose unique	Doxycycline 200 mg/j 14 jours